





Памятка о мерах профилактики педикулеза

Педикулез, или вшивость – это паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью. Известно 3 вида вшей: наиболее часто встречается головной педикулез. Вши в течение своей жизни, находясь на теле человека и питаясь его кровью, в своем развитии проходят три стадии: яйцо (гнида), личинка и половозрелая вошь. Вошь имеет размеры до 1,8 мм – это как точка, которую мы наносим шариковой ручкой на бумагу. Яйца вшей закрепляются обычно непосредственно у корней волос и крепко склеены с волосами за счет вещества, которое выделяет самка. Головная вошь чаще всего живет на висках, затылке, темени. Вне тела человека головная вошь живет 24 часа.

Клинически педикулез проявляется нарушением общего состояния, зудом. Кроме того, места расчеса укусов насекомых являются входными воротами для инфекции и становятся источником развития воспалительного процесса и появления гнойничковых заболеваний.

Вши являются переносчиками ряда опасных инфекционных заболеваний, в частности, сыпного и возвратного тифа.

Распространяются паразиты, переползая с одного человека на другого во время непосредственного контакта (за минуту они преодолевают 20 см). А также при использовании общих вещей: одежды, белья, головных уборов, расчесок, щеток для волос.

Наибольшая заболеваемость регистрируется среди организованных детей: дошкольников и школьников, что связано с тесным контактом внутри детского коллектива и в учреждениях дополнительного образования (кружках, секциях).

Установление факта педикулеза требует незамедлительного обращения к медикам и экстренного лечения.

Профилактика: соблюдение мер личной гигиены—содержать волосы на голове в чистоте, в образовательное учреждение приходить с прибранными волосами (желательно собирать длинные волосы в косу); не пользоваться чужими расческами, заколками; не примерять на себя чужие вещи (особенно шапки, шарфы).

